PLANTPRODUCTS®

Insecticide Rycar™



L'insecticide Rycar™ est polyvalent et offre un excellent contrôle des pucerons et des aleurodes (tous les biotypes), mais a peu d'incidence sur les insectes bénéfiques et les pollinisateurs.

- Contrôle efficace des pucerons et des aleurodes sur les concombres, aubergines, laitues, poivrons, tomates et plantes ornementales cultivés en serre.
- Agit par contact et par ingestion; les insectes cessent de s'alimenter dans les 2 heures suivant le traitement et commencent à mourir dans les 48 heures qui suivent.
- Convient parfaitement aux programmes de lutte intégrée contreles parasites (LIP).

Voici comment l'insecticide Rycar fonctionne

Au contact et à l'ingestion de l'insecticide Rycar, les ravageurs cibles cessent de s'alimenter dans les deux heures qui suivent. Les insectes cibles sont incapables de s'alimenter et peinent à s'orienter et à se déplacer. La mort survient dans les 48 heures.

L'effet de pénétration

L'insecticide Rycar peut contrôler les ravageurs quelle que soit leur position sur la canopée, ce qui est excellent pour les cultures à feuillage dense. Le Rycar pénètre la cuticule cireuse des plantes et se déplace vers les bords des feuilles. Lorsque les ravageurs cibles se nourrissent sur les feuilles traitées, ils ingèrent le Rycar et sont contrôlés.

- Insecticide pulvérisé sur la feuille.
- Couverture complète essentielle pour assurer une efficacité optimale.
- Insectes contrôlés sur le dessus et le dessous des feuilles.



RYCAR™ INSECTICIDE

Lutte intégrée contre les parasites

Les insectes bénéfiques et les pollinisateurs jouent un rôle important dans la production et la protection de plusieurscultures en serre. Malgré son efficacité contre les ravageurs cibles, Rycar a peu d'effet sur les insectes bénéfiques oules bourdons.

Espèces d'insectes bénéfiques		Stade de vie	Effet Rycar
Coccinelle	*Harmonia axyridis*	Adulte	Aucun effet
Punaise prédatrice	*Orius insidiosus*	Adulte	Aucun effet
Guêpe parasitoïde	*Encarsia formosa*	Pupe	Certains effets
Cécidomyie du puceron	*Aphidoletes aphidimyza*	Larve	Aucun effet
Acariens prédateurs	*Hypoasis miles* *Amblyseius cucumeris* *Amblyseius californicus* *Phytoseiulus persimillis*	Adulte	Aucun effet
Bourdon		Adulte	Aucun effet

Meilleures pratiques de gestion

- Group IRAC : 9B
  - Dans la mesure du possible, alterner Rycar avec des insecticides appartenant à des groupes différents, mais ciblant les mêmes ravageurs.
- Ne pas utiliser d'applicateurs à faible volume.
- Ne pas dépasser 2 041 L de solution de pulvérisation par hectare.
- Délai de sécurité : 12 heures.
- Délai d'attente avant la récolte : 1 jour

Ravageurs cible	Taux	Notes
Concombres, aubergines, poivrons, tomates en serre		
Pucerons	125 - 164 mL / 1000 L	Nombre d'applications maximales par cycle de culture : 1 Volume maximal de Rycar par cycle de culture : 335 ml/ha
Aleurodes	125 - 164 mL / 1000 L	
Laitue en serre		
Pucerons	187 - 250 mL / 1000 L	Nombre minimum de jours entre les applications : 10 Nombre d'applications maximales par cycle de culture : 2 Volume maximal de Rycar par cycle de culture : 1 020 ml/ha
Aleurodes	125 - 250 mL / 1000 L	
Plantes ornementales herbacées et ligneuses à feuilles caduques cultivées en serre (sauf fleurs coupées)		
Pucerons	187 - 250 mL / 1000 L	Nombre minimum de jours entre les applications : 10 Nombre d'applications maximales par cycle de culture : 2 Volume maximal de Rycar par cycle de culture : 1 020 ml/ha
Aleurodes	125 - 250 mL / 1000 L	

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.

Manufactured by NICHINO AMERICA

Le logo Plant Products est une marque déposée de Plant Products. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2024 Plant Products