

COMMERCIAL**Actinovate® SP****Fongicide**

Pour réprimer: la pourriture de fruit/la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) et l'oïdium (*Sphaerotheca macularis*) sur les fraises de grande culture et cultivées en serre, et le cannabis et le chanvre cultivé à l'intérieur et en plein champ, l'oïdium (*Erysiphe cichoracearum*) sur les gerbéra de grande culture et cultivées en serre, l'oïdium (*Leveillula taurica*) sur les poivrons de grande culture et cultivées en serre, le blanc (*Podosphaera xanthii*) dans les cucurbitacées (groupe de culture 9) de grande culture et cultivées en serre, le blanc (*Leveillula taurica*, *Oidium lycopersicum*) dans les tomates de grande culture et cultivées en serre, l'oïdium (*Uncinula necator*(*Erysiphe*)) sur les raisins, pourriture de la semence, fonte de semis en prélevée, fonte de semis en postlevée et pourriture des racines causée par les espèces de *Pythium* spp. sur les concombres de serres, la laitue de serres, les légumes-fruits de serres, et le cannabis et le chanvre cultivé à l'intérieur, et pour la répression partielle de pourriture sclérotique (*Monilinia vaccinii-corymbosi*) sur les bleuets (en corymbes et nains). Peut réduire des symptômes de pourriture de fruit Anthracnose (*Colletotrichum acutatum*) sur les fraises. Offre aussi la répression des maladies suivantes dans les ornementaux énumérés ci-dessous et cultivés en serre: flétrissure fusarienne sur les cyclamen, pourridié pythien sur les petunias, la pourriture des racines et du collet causé par *Rhizoctonia* sur les geraniums et le blanc sur les verbenas.

POUDRE SOLUBLE**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**

PRINCIPE ACTIF: *Streptomyces lydicus* souche WYEC 108.....1,0 x10⁷ CFU/g (min.) (0,0371%)

ATTENTION: IRRITANT POUR LES YEUX

AGENT SENSIBILISANT POTENTIEL

No D'HOMOLOGATION 28672 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

No de brevet Américain: 5,403,584

No de brevet Canadien: 2,166,096

Novozymes BioAg Limited

3935 Thatcher Avenue

Saskatoon SK S7R 1A3

Phone: +1 306 657-8200

Contenu net : 20 g à 9,5 kg (*Veuillez indiquer, le cas échéant*)

Date de fabrication : jj/mm/aaaa

Code de lot/Date d'expiration : XXXX/jj-mm-aaaa

MISES EN GARDE**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Peut entraîner une sensibilisation. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les poussières ni le brouillard de pulvérisation. Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des lunettes de protection étanches, des gants imperméables, des chaussettes et des chaussures, ainsi qu'un respirateur à masque avec filtre N, R ou P approuvé par le NIOSH pour manipuler, mélanger, charger ou appliquer le produit, et lors de toute activité de nettoyage et de réparation.

Délai de sécurité (DS) : NE PAS permettre aux travailleurs d'entrer dans les zones traitées avant 4 heures ou jusqu'à ce que le produit pulvérisé soit sec, à moins de porter des gants imperméables, un vêtement à manches longues, un pantalon long, des chaussettes et des chaussures.

Appliquer le produit sur les cultures agricoles seulement si le risque de dérive vers des aires d'habitation ou d'activités humaines, comme des maisons, des chalets, des écoles ou des sites récréatifs, est minime. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, des zones d'inversion de température, de l'équipement d'application et des paramètres de fonctionnement des pulvérisateurs.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

Afin de réduire le risque de contamination des habitats aquatiques par le ruissellement en provenance des zones traitées, éviter d'appliquer ce produit sur une pente modérée ou forte, ou sur un sol compacté ou argileux. Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues. On peut réduire la contamination des habitats aquatiques causée par le ruissellement en prévoyant une bande de végétation filtrante entre la zone traitée et la rive du plan d'eau. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans la section « Atténuation du ruissellement » du site Web Canada.ca.

MODE D'EMPLOI

Renseignements généraux: Actinovate SP est un fongicide biologique qui permet de réprimer la pourriture de fruit/la pourriture grise et l'oïdium dans les fraises de grande culture et cultivées en serre, et le cannabis et le chanvre cultivé à l'intérieur et en plein champ, l'oïdium sur les poivrons de grande culture et cultivées en serre, l'oïdium sur les gerbéra de grande culture et cultivées en serre, le blanc dans les cucurbitacées (groupe de culture 9) de grande culture et cultivées en serre, le blanc dans les tomates de grande culture et cultivées en serre, l'oïdium (*Uncinula necator*(*Erysiphe*)) sur les raisins, pourriture de la semence, fonte de semis en prélevée, fonte de semis en postlevée et pourriture des racines causée par les espèces de *Pythium* spp. sur les concombres de serres, la laitue de serres, les légumes-fruits de serres, et le cannabis et le chanvre cultivé à l'intérieur, et pour la répression partielle de pourriture sclérotique (*Monilinia vaccinii-corymbosi*) sur les bleuets (en corymbes et nains). L'Actinovate SP peut réduire des symptômes de pourriture de fruit Anthracnose sur les fraises. Offre aussi la répression des maladies suivantes dans les ornementaux énumérés ci-dessous et cultivés en serre: flétrissure fusarienne sur les cyclamen, pourridié pythien sur les petunias, la pourriture des racines et du collet causé par *Rhizoctonia* sur les geraniums et le blanc sur les verbenas.

Délai d'attente avant la récolte (DAAR) : [nom du produit] peut être utilisé jusqu'au jour de la récolte, inclusivement. DAAR = 0 jour.

Comme ce produit n'est pas homologué pour la lutte contre les organismes nuisibles dans les milieux aquatiques, NE PAS l'utiliser à cette fin.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

NE PAS appliquer ce produit par voie aérienne.

Mode d'emploi:

Fraises (de grande culture et de serre): Pour réprimer la pourriture de fruit (*Botrytis cinerea*) et l'oïdium (*Sphaerotheca macularis*).

Dissoudre 425 g d'Actinovate SP dans 1 100 L d'eau par hectare et appliquer en pulvérisation foliaire sur les feuilles et les bourgeons. Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. Effectuer une première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie; répéter l'application tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application le plus court lorsque l'incidence de la maladie est élevée. On peut appliquer Actinovate SP à l'aide d'un équipement manuel porté sur le dos ou d'un équipement de pulvérisation au sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP par ha	Remarques
Fraise (de grande culture et de serre)	Pourriture de fruit (<i>Botrytis cinerea</i>) Oïdium (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	425 g/1100 L d'eau	Effectuer la première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. Appliquer sur les feuilles et les bourgeons. Répéter

			l'application tous les 7 à 14 jours.
--	--	--	--------------------------------------

Gerbéra (de grande culture et de serre): Pour réprimer l'oïdium (*Erysiphe cichoracearum*) Dissoudre 170 g d'Actinovate SP dans 380 L d'eau (ou 500 g dans 1 100 L d'eau par ha) et appliquer en pulvérisation foliaire. Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. Effectuer la première application au moment de la transplantation puis effectuer deux pulvérisations subséquentes à des intervalles de sept jours. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP par ha	Remarques
Gerbéra (de grande culture et de serre)	Oïdium (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	170 g/380 L d'eau (500 g/1100 L d'eau/ha)	Commencer les applications au moment de la transplantation et effectuer deux pulvérisations subséquentes à des intervalles de sept jours.

Poivron (de grande culture et de serre): Pour réprimer l'oïdium (*Leveillula taurica*)

Dissoudre 425 g d'Actinovate SP dans 1 100 L d'eau et appliquer en pulvérisation foliaire sur les feuilles et les bourgeons. Effectuer la première application au moment de la transplantation et répéter tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application le plus court lorsque l'incidence de la maladie est élevée. Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. On peut appliquer Actinovate SP à l'aide d'un équipement manuel porté sur le dos ou d'un équipement de pulvérisation au sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP par ha	Remarques
Poivron (de grande culture et de serre)	Oïdium (<i>Leveillula taurica</i>)	425 g/1100 L d'eau	Commencer les applications au moment de la transplantation et effectuer des pulvérisations subséquentes tous les sept jours.

Raisin: Pour réprimer l'oïdium ((*Uncinula* (*Erysiphe*) *necator*))

Dissoudre 425 à 840 g d'Actinovate SP dans 500 à 1000 L d'eau par hectare et appliquer en pulvérisation foliaire. Utiliser un plus haut taux quand les conditions sont favorables pour le développement de maladie. Choisir un volume d'eau qui offrira une couverture uniforme et complète des parties végétales protégées. Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. Effectuer une première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie; répéter l'application tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application la plus courte lorsque l'incidence de la maladie est élevée. On peut

appliquer Actinovate SP à l'aide d'un équipement manuel porté sur le dos ou d'un équipement de pulvérisation au sol.

Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP par ha	Remarques
Raisin	Oïdium ((<i>Uncinula</i> (<i>Erysiphe</i>) <i>necator</i>))	425 à 840g	Effectuer la première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie et répéter l'application tous les 7 à 14 jours.

Bleuets (en corymbes et nains): Pour la répression partielle de pourriture sclérotique (*Monilinia vaccinii-corymbosi*)

Dissoudre 425 à 840 g d'Actinovate SP dans 200 à 1400 L d'eau par hectare et appliquer en pulvérisation foliaire. Utiliser un plus haut taux quand les conditions sont favorables pour le développement de maladie. Choisir un volume d'eau qui offrira une couverture uniforme et complète des parties végétales protégées. Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. Effectuer une première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie; répéter l'application tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application la plus courte lorsque l'incidence de la maladie est élevée. On peut appliquer Actinovate SP à l'aide d'un équipement manuel porté sur le dos ou d'un équipement de pulvérisation au sol.

Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP par ha	Remarques
Bleuets (en corymbes et nains)	pourriture sclérotique (<i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i>)	425 à 840g	Effectuer la première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie et répéter l'application tous les 7 à 14 jours.

CANNABIS ET CHANVRE CULTIVÉ À L'INTÉRIEUR ET EN PLEIN CHAMP

APPLICATIONS FOLIAIRES

Pour la répression de la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) et l'oïdium (*Sphaerotheca macularis*) sur le cannabis et chanvre cultivé à l'intérieur et en plein champ.

Dissoudre 425 g d'Actinovate SP dans 1 100 L d'eau par hectare et appliquer en pulvérisation foliaire sur les feuilles et les bourgeons. Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. Effectuer la première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie et répéter les applications tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application le plus court lorsque l'incidence de la maladie est élevée. On peut appliquer Actinovate SP à l'aide d'un équipement manuel porté sur le dos ou d'un équipement de pulvérisation au sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

SYSTÈMES HYDROPONQUES ET TRAITEMENT DU SOL PAR TREMPAGE SUR LE CANNABIS ET CHANVRE CULTIVÉS À L'INTÉRIEUR

Pour la répression de pourriture de la semence, fonte de semis en prélevée, fonte de semis en postlevée et pourriture des racines causée par les espèces de *Pythium* spp. sur cannabis et chanvre cultivés à l'intérieur

Dissoudre la dose recommandée d'Actinovate SP dans 1000 L d'eau pour créer une solution. Appliquer la solution au sol par trempage ou par système de culture hydroponique aux plantes/supports de culture jusqu'à ce que le pot soit complètement mouillé sans créer de ruissellement. Effectuer une première application immédiatement après l'ensemencement ou la transplantation ou lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. Répéter l'application tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application le plus court lorsque l'incidence de la maladie est élevée. Actinovate SP peut être appliqué par buses d'arrosage à basse pression tels que des buses à jet plat, par rampes de pulvérisation ou asperseurs rotatifs élevés, par systèmes de culture hydroponique, injecteurs, tables d'inondation ou autres méthodes de bassinage du sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Méthode d'application	Maladies	Dose d'Actinovate SP par ha	Remarques
Cannabis et chanvre cultivé à l'intérieur et en plein champ			
Foliaire	Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) l'oïdium (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	425 g/1100 L d'eau	Commencer les applications lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. Appliquer sur le feuillage et les bourgeons. Répéter l'application tous les 7 à 14 jours avec un maximum de 18 candidatures. .
Cannabis et chanvre cultivé à l'intérieur			
Systèmes hydroponiques	Pourriture de la semence, fonte de semis en prélevée, fonte de semis en postlevée et pourriture des racines causée par les espèces de <i>Pythium</i> spp.	420 à 840 g/ha	Appliquer la solution sur le milieu de culture. Répéter l'application tous les 7 à 14 jours avec un maximum de 18 candidatures. .
Traitement du sol par trempage		42 à 84 g/100 L d'eau/ 1 m ³ milieu de culture	Appliquer le traitement par trempage du sol. Répéter l'application tous les 7 à 14 jours avec un maximum de 18 candidatures. .

Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres que Novozymes BioAg Ltd. dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, Novozymes BioAg Ltd. n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) et/ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. Avant d'appliquer le produit à grande échelle, l'utilisateur devrait faire un essai sur une surface réduite, dans les conditions du milieu et en suivant les pratiques courantes pour confirmer que le produit se prête à une application généralisée.

Mode d'emploi - Pulvérisations foliaires

Cucurbitacées (de grande culture et de serre): Groupe de culture 9 – chayotte, courge cireuse, pastèque à confire, concombre, concombre des Antilles, gourde comestible, espèces de Momordique, melon véritable, citrouille, courge d'hiver et d'été, et pastèque: Pour réprimer le blanc (*Podosphaera xanthii*).

Dissoudre 420 g d'Actinovate SP dans 470 à 800 L d'eau par hectare (choisir un volume d'eau qui garantira la couverture uniforme et complète des plantes) et appliquer en pulvérisation foliaire.

Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. Effectuer une première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie; répéter l'application tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application la plus courte lorsque l'incidence de la maladie est élevée. On peut appliquer Actinovate SP à l'aide d'un équipement manuel porté sur le dos ou d'un équipement de pulvérisation au sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP par ha	Remarques
Cucurbitacées (de grande culture et de serre): Groupe de culture 9 – chayotte, courge cireuse, pastèque à confire, concombre, concombre des Antilles, gourde comestibles, espèces de Momordique, melon véritable, citrouille, courge d'hiver et d'été, et pastèque	le blanc (<i>Podosphaera xanthii</i>)	420 g/470 à 800 L d'eau	Effectuer la première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie et répéter l'application tous les 7 à 14 jours.

Tomate (de grande culture et de serre): Pour réprimer le blanc (*Leveillula taurica*, *Oidium lycopersicum*).

Dissoudre 425 à 840 g d'Actinovate SP dans 700 L d'eau par hectare, et appliquer en pulvérisation foliaire. Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. Effectuer une première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie; répéter l'application tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application la plus courte lorsque l'incidence de la maladie est élevée. On peut appliquer Actinovate SP à l'aide d'un équipement manuel porté sur le dos ou d'un équipement de pulvérisation au sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP par ha	Remarques
---------	----------	-----------------------------	-----------

Tomate (de grande culture et de serre)	le blanc (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersicum</i>)	425 à 840 g/700 L d'eau	Effectuer la première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie et répéter l'application tous les 7 à 14 jours.
Fraise : Peut réduire des symptômes de pourriture de fruit Anthracnose (<i>Colletotrichum acutatum</i>). Dissoudre 425 g d'Actinovate SP dans 1100 L d'eau par hectare et appliquer en pulvérisation foliaire. Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. Effectuer une première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie; répéter l'application tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application la plus courte lorsque l'incidence de la maladie est élevée. On peut appliquer Actinovate SP à l'aide d'un équipement manuel porté sur le dos ou d'un équipement de pulvérisation au sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.			
Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP par ha	Remarques
Fraise	pourriture de fruit Anthracnose (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	425 g/1100 L d'eau	Effectuer la première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie et répéter l'application tous les 7 à 14 jours.
Cyclamen (de serre): Pour réprimer la flétrissure fusarienne (<i>Fusarium oxysporum</i>). Dissoudre 500 g d'Actinovate SP dans 1000 L d'eau pour créer une solution. Appliquer la solution comme bassinage aux plantes/supports de culture jusqu'à ce que le pot soit complètement mouillé sans créer de ruissellement. Effectuer une première application aussi tôt que possible dans la vie de la plante, de préférence lors du piquage des boutures en substrat, du transfert des boutures enracinées ou en semant des graines. Répéter l'application tous les 4 à 12 semaines ou lorsque la pression de la maladie augmente. Utiliser l'intervalle d'application le plus court lorsque l'incidence de la maladie est élevée. Actinovate SP peut être appliqué par buses d'arrosage à basse pression tels que des buses à jet plat, par rampes de pulvérisation ou asperseurs rotatifs élevés, par systèmes de culture hydroponique, injecteurs, tables d'inondation ou autres méthodes de bassinage du sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.			
Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP	Remarques
Cyclamen (de serre)	flétrissure fusarienne (<i>Fusarium oxysporum</i>)	500 g/1000 L d'eau	Effectuer une première application aussi tôt dans la vie de la plante que possible et répéter l'application tous les 4 à 12 semaines ou lorsque la pression de maladie augmente.

Petunia (de serre): Pour réprimer le pourridié pythien (*Pythium spp.*).

Dissoudre 500 g d'Actinovate SP dans 1000 L d'eau pour créer une solution. Appliquer la solution comme bassinage aux plantes/supports de culture jusqu'à ce que le pot soit complètement mouillé sans créer de ruissellement. Effectuer une première application aussi tôt que possible dans la vie de la plante, de préférence lors du piquage des boutures en substrat, du transfert des boutures enracinées ou en semant des graines. Répéter l'application tous les 4 à 12 semaines ou lorsque la pression de la maladie augmente. Utiliser l'intervalle d'application la plus courte lorsque l'incidence de la maladie est élevée. Actinovate SP peut être appliqué par buses d'arrosage à basse pression tels que des buses à jet plat, par rampes de pulvérisation ou asperseurs rotatifs élevés, par systèmes de culture hydroponique, injecteurs, tables d'inondation ou autres méthodes de bassinage du sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP	Remarques
Petunia (de serre)	pourridié pythien (<i>Pythium spp.</i>)	500 g/1000 L d'eau	Effectuer une première application aussi tôt dans la vie de la plante que possible et répéter l'application tous les 4 à 12 semaines ou lorsque la pression de maladie augmente.

Mode d'emploi - Traitements de semence

Concombre de serres, laitue de serres et légumes-fruits de serres (aubergine d'Afrique, tomate groseille, aubergine, morelle scabre, baie de Goji, cerises de terre, bicolore, okra, fausse aubergine, pépino, poivron, piment autre que poivron, aubergine écarlate, morelle réfléchie, tomatille, tomate et cultivars, variétés et/ou hybrides de ceux-ci) : La répression de la pourriture de la semence/de la fonte de semis en prélevée et postlevée, et de la pourriture de la racine causée par les espèces de *Pythium spp.*

Ne pas utiliser les semences traitées aux fins d'alimentation humaine ou animale, ou encore pour obtenir de l'huile. Ne traiter que les semences requises pour utilisation immédiate en minimisant l'intervalle de temps entre le traitement et l'ensemencement. Ne pas entreposer les semences traitées après le temps des semences. Appliquer le traitement de semence seulement à la ferme ou immédiatement avant de semer.

Cultures	Maladies	Dose d'Actinovate SP	Type d'application et remarques
Concombre de serres Laitue de serres Légumes-fruits de serres	Pourriture de la semence/source de semis en prélevée et postlevée, pourriture de la racine causée par les espèces de <i>Pythium</i>	7,5 à 42 g/300 mL d'eau/kg de semence	Pulvérisation sur la semence ou trempage dans bouillie. Appliquer au moyen d'un équipement commercial pour traitement de semence (brumisateurs), d'une bouillie, ou autres méthodes comparables, afin de couvrir entièrement la semence. Avant de semer, dissoudre Actinovate SP dans l'eau et le pulvériser directement sur la semence.
		7,5 à 42 g/kg de semence	Pelliculage à sec en trémie Appliquer directement à la semence comme pellicule sèche. Appliquer de façon à assurer un pelliculage égal sur la semence.

Mode D'emploi - Systèmes hydroponiques et traitement du sol par trempage.

Concombre de serres, laitue de serres et légumes-fruits de serres (aubergine d'Afrique, tomate groseille, aubergine, morelle scabre, baie de Goji, cerises de terre, bicolore, okra, fausse aubergine, pépino, poivron, piment autre que poivron, aubergine écarlate, morelle réfléchie, tomatille, tomate et cultivars, variétés et/ou hybrides de ceux-ci) : La répression de la pourriture de la semence/de la fonte de semis en prélevée et postlevée, et de la pourriture de la racine causée par les espèces de *Pythium* spp.

Appliquer Actinovate SP immédiatement après l'ensemencement, puis appliquer à nouveau tous les 7 à 14 jours.

Cultures	Maladies	Dose d'Actinovate SP	Type d'application et remarques
Concombre de serres	Pourriture de la semence/source de semis en prélevée et postlevée, pourriture de la racine causée par les espèces de <i>Pythium</i>	420 à 840 g/ha	Systèmes hydroponiques : Appliquer la solution au milieu de culture
Laitue de serres		42 à 84 g/100 L d'eau/ 1 m ³ milieu de culture	Trempages du sol : appliquer le traitement par trempage du sol.
Légumes-fruits de serres			

Geranium (de serre): Pour réprimer la pourriture des racines et du collet de *Rhizoctonia* (*Rhizoctonia solani*).

Dissoudre 500 g d'Actinovate SP dans 1000 L d'eau pour créer une solution. Appliquer la solution comme bassinage aux plantes/soutiens de culture jusqu'à ce que le pot soit complètement mouillé sans créer de ruissellement. Effectuer une première application aussi tôt que possible dans la vie de la plante, de préférence lors du piquage des boutures en substrat, du transfert des boutures enracinées ou en semant des graines. Répéter l'application tous les 4 à 12 semaines ou lorsque la pression de la maladie augmente. Utiliser l'intervalle d'application le plus court lorsque l'incidence de la maladie est élevée. Actinovate SP peut être appliqué par buses d'arrosage à basse pression tels que des buses à jet plat, par rampes de pulvérisation ou asperseurs rotatifs élevés, par systèmes de culture hydroponique, injecteurs, tables d'inondation ou autres méthodes de bassinage du sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP	Remarques
Geranium (de serre)	pourriture des racines et du collet de <i>Rhizoctonia</i> (<i>Rhizoctonia solani</i>)	500 g/1000 L d'eau	Effectuer une première application aussi tôt dans la vie de la plante que possible et répéter l'application tous les 4 à 12 semaines ou lorsque la pression de maladie augmente.

Verbena (de serre): Pour réprimer le blanc (*Podosphaera xanthii*).

Dissoudre 500 g d'Actinovate SP dans 1000 L d'eau et appliquer en pulvérisation foliaire. Pulvériser pour mouiller les feuilles, mais éviter le ruissellement. Choisir un volume d'eau qui offrira une couverture uniforme et complète des parties végétales protégées. Effectuer une première application lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie; répéter l'application tous les 7 à 14 jours. Utiliser l'intervalle d'application le plus court lorsque l'incidence de la maladie est élevée. On peut appliquer Actinovate SP à l'aide d'un équipement manuel porté sur le dos ou d'un équipement de pulvérisation au sol. Nettoyer l'équipement d'épandage avant d'utiliser ce produit et utiliser la bouillie de pulvérisation dans les 4 heures suivant la préparation.

Culture	Maladies	Dose d'Actinovate SP	Remarques
Verbena (de serre)	le blanc (<i>Podosphaera xanthii</i>)	500 g/1000 L d'eau	Effectuer la première application sur les feuilles et les bourgeons lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie et répéter l'application tous les 7 à 14 jours selon la pression exercée par la maladie.

ENTREPOSAGE

Ne pas contaminer l'eau et la nourriture humaine ou animale lors de l'entreposage et de l'élimination. Actinovate SP devrait être utilisé dans les 24 mois de la date de fabrication lorsqu'il est conservé à température ambiante. Entreposer hors de l'ensoleillement direct et loin des sources de chaleur. Craint l'excès de chaleur et le gel. Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale/territoriale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale/territoriale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial/territorial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Novozymes BioAg Limited
 3935 Thatcher Avenue
 Saskatoon SK S7R 1A3
 Phone: +1 306 657-8200

Contenu net : 20 g à 9,5 kg (*Veuillez indiquer, le cas échéant*)

Date de fabrication : jj/mm/aaaa

Code de lot/Date d'expiration : XXXX/jj-mm-aaaa