

APPLICATION TIMING

■ Biopolin® should be applied:

- once at the beginning of flowering period,
- at the latest – directly before the full bloom of the crop.
- Treatment should be repeated only on long blooming crops (about 10-12 days after first treatment) or if heavy rain occurs just after spraying.
- Application should be done in the morning in rainless and calm weather.

VEGETABLES, FRUIT TREES AND BERRIES

- Recommended dose: 2 L/ha, 500-750 litres of water per ha.
- Preparation should be sprayed on the entire crop area.

CANOLA, ALFALFA FOR SEED PRODUCTION

In canola Biopolin® can be used in one of the following ways:

■ SPRAYING WHOLE FIELD AREA.

Recommended dose: **0.75-1.0 L/ha** with adequate water to ensure thorough coverage

■ SPRAYING THE FIELD ON ITS PERIMETER,

on a belt with a width of approximately several metres and inside the field, every fourth / fifth tramline (it is sufficient to spray approx. 25%-30% of the field with Biopolin® preparation) with Biopolin® diluted in water at 1% concentration (1L Biopolin® in 100 L of water, applying approximately 300 L per ha). If it is applied in such a way, the usage of the preparation per 1 ha is about **0.75-1 L/ha**.



Slow release technology.

Advanced formulation technology
– SLOW RELEASE TECHNOLOGY.

Slow release of pollination stimulants
– Pollinators are active for a longer time.

Shelf life: 3 years
from manufacture
date.

Batch number and
manufacturing date:

POLLINATION STIMULANT, ENHANCES CROP POLLINATION.
STIMULANT DE LA POLLINISATION, AMÉLIORE LA POLLINISATION DES CULTURES.



Designed for use
on vegetables, fruit
trees, berries, alfalfa
for seed production
and canola

Conçu pour être utilisé
sur les légumes, arbres
fruitiers, baies, luzerne
pour la production
de semences et canola



Designed for use on various
crops pollinated with
the assistance of insects
and bees

Conçu pour l' utilisation sur
diverses cultures pollinisées
avec l'aide d'insectes et
d'abeilles

BIOPOLIN® IS A POLLINATOR
STIMULANT.

It is sprayed on the crops
during the bloom period.

Treated bloom become more
attractive to pollinators and
thus they are more often
visited by these insects.

This results in better
pollination increasing plant
pollen availability and
consequently substantial
increase in yield
and its quality.

BIOPOLIN® EST UN STIMULANT
DES POLLINISATEURS.

Il est pulvérisé sur les
cultures pendant la période
de floraison.

Les fleurs traitées deviennent
plus attrayantes pour
les pollinisateurs et sont donc
plus souvent visitées par
ces insectes.

Il en résulte une meilleure
pollinisation augmentant
la disponibilité du
pollen des plantes et
par conséquent une
augmentation substantielle
du rendement
et de sa qualité.

1L

PRODUKT
POLSKI

CALENDRIER D'APPLICATION

■ Biopolin® doit être appliqué

- une fois au début de la période de floraison,
- au plus tard – juste avant la pleine floraison de la culture.
- Le traitement doit être répété uniquement sur les cultures à longue floraison (environ 10 à 12 jours après le premier traitement) ou en cas de fortes pluies juste après la pulvérisation.
- L'application doit être effectuée le matin par temps calme et sans pluie.

LÉGUMES, ARBRES FRUITIERS ET BAIES

- Dosage recommandé : 2 L/ha, 500-750 litres d'eau par ha. La préparation doit être pulvérisée sur toute la surface cultivée.

CANOLA, LUZERNE POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES

Sur canola, Biopolin® peut être utilisé de l'une des manières suivantes :

■ PULVÉRISER TOUTE LA SURFACE DU CHAMP.

Dosage recommandé : **0,75-1,0 L/ha** avec suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète.

■ PULVÉRISER LE CHAMP SUR SON PÉRIMÈTRE,

sur une bande d'une largeur d'environ plusieurs mètres et à l'intérieur du champ, tous les quatre / cinq jalonage (il suffit de pulvériser environ 25%-30% du champ avec la préparation Biopolin®) avec Biopolin® dilué dans de l'eau à 1% de concentration (1L Biopolin® dans 100 L d'eau, en appliquant environ 300 L par ha). S'il est appliqué de cette manière, l'utilisation de la préparation pour 1 ha est d'environ **0,75-1 L/ha**.



Technologie à libération lente.

Technologie de formulation avancée
– TECHNOLOGIE À LIBÉRATION LENTE.

Libération lente de stimulants
de pollinisation – Les pollinisateurs
sont actifs plus longtemps.

Période de validité : 3 ans à compter de la date de production

Date de fabrication et Numéro de lot voir d'un autre côté.

Biopolin®

May cause an allergic skin reaction.

Avoid breathing mist/vapours/spray.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

IF ON SKIN: Wash with plenty of water.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Contains: natural terpenoid compounds, polysaccharides, additives of natural origin.

Components contributing to classification:
Citral, 2-methoxy-4-(propenyl)phenol.



WARNING
ATTENTION

FR

Biopolin®

Peut provoquer une allergie cutanée.

Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Contient : composés terpénoïdes naturels, polysaccharides, additifs d'origine naturelle.

Composants contribuant à la classification :
Citral, 2-méthoxy-4-(propényl)phénol.

MANUFACTURER

/FABRIQUÉ PAR :

ICB Pharma
10 Lema Street, 43-603 Jaworzno, Poland
/10, rue Lema, 43-603 Jaworzno, Pologne



DISTRIBUTED BY /DISTRIBUÉ PAR :

Andermatt Canada Inc
1350 Regent St, Fredericton N.B. E3C 2G6
506-444-5690

For more information about Biopolin®
/Pour voir plus d'informations sur Biopolin® :
e-mail: info@andermttcanada.ca



Biopolin® is a trademark registered by ICB Pharma.

Biopolin® est une marque de commerce déposée par
ICB Pharma.