

2025-3336
2025-10-29

BIOCERES G WP

COMMERCIAL

Mycoinsecticide biologique

Poudre mouillable

Pour réduire le nombre d'aleurodes, de pucerons, et de thrips dans les cultures en serre de légumes (incluant les transplants), fines herbes et épices, fraises, plantes ornementales et dans le cannabis. Pour réduire le nombre de pucerons des racines du riz dans le cannabis cultivé en serre ou dans d'autres structures fermées. Pour réduire le nombre de doryphore de la pomme de terre dans les cultures d'aubergines produites en serres.

Pour réduire le nombre de pucerons, de thrips, d'aleurodes et de punaises dans les cultures en serre de mûres et de framboises (sous-groupe de cultures 13-07A).

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

**SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL
AVERTISSEMENT- IRRITANT POUR LES YEUX
AVERTISSEMENT - POISON**

PRINCIPE ACTIF: *Beauveria bassiana* souche ANT-03 contenant un minimum de 1×10^{10} spores (conidies)/g.

Avertissement, contient l'allergène soya

No. D'HOMOLOGATION: 31231 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 500 g à 1 kg

Numéro de lot

Date de fabrication: _____

**Danstar Ferment AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
Switzerland**

**Canadian Agent
LALLEMAND INC./LALLEMAND PLANT CARE
59 Industrial Park Crescent, Unit 1
Sault Ste, Marie, ON P6B 5P3
Phone: 1-888-236-7378**

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Peut-être fatal lorsqu'il est inhalé. NE PAS inhaler/respirer les poussières ou les brouillards. Provoque une irritation des yeux. NE PAS mettre en contact avec les yeux. Peut entraîner une sensibilisation. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants imperméables, des lunettes de protection, des chaussures et des chaussettes, et au moins un masque respiratoire avec filtrage des particules, approuvées par le NIOSH muni d'un filtre N, R ou P pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et les réparations. Bien se laver avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant leur réutilisation.

Délai de sécurité : Ne pas circuler ou permettre à quiconque de circuler pour une période de 4 heures dans les sites traités jusqu'à ce que le produit pulvérisé soit sec à moins de porter l'équipement de protection personnel approprié, incluant une chemise à manches longues et un pantalon long, des chaussures et des chaussettes et des gants imperméables à l'eau.

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administrier un traitement symptomatique.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

Les effets potentiels de ce produit sur certains insectes bénéfiques et pollinisateurs, pouvant être utilisés à l'intérieur d'un programme de lutte intégrée (LI) en serre, ne sont pas connus. Peut être nocif pour certains insectes bénéfiques. Éviter le contact direct avec les insectes bénéfiques lors d'applications par pulvérisation. NE PAS appliquer là où les abeilles butinent. **NE PAS laisser les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des serres d'atteindre les lacs, les cours d'eau, les étangs, ou tout autre plan d'eau. NE PAS contaminer les**

sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets.

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec. Peut être entreposé jusqu'à 18 mois au réfrigérateur (4 °C) ou jusqu'à 6 mois à 21 °C dans un emballage fermé. Le produit peut être conservé jusqu'à 3 mois à 21 °C dans un emballage ouvert. Refermer hermétiquement le contenant entamé afin de prévenir toute perte d'efficacité.

Le BIOCERES G WP contient des spores vivantes du champignon naturellement retrouvées dans le sol, *B. bassiana* souche ANT-03. Elles risquent d'être endommagées si elles sont exposées à des températures supérieures à 25 °C ou si elles sont en contact avec l'eau pendant plus de 24 heures. Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinée à la consommation humaine ou animale.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

BIOCERES G WP est une formulation de poudre mouillable ayant comme ingrédient actif des spores vivantes du champignon *B. bassiana* souche ANT-03 naturellement retrouvées dans le sol.

BIOCERES® G WP réduit le nombre de :

- Aleurodes, pucerons et thrips dans les cultures en serre de légumes (énumérées ci-dessous*) et les transplants, les fines herbes et les épices, les cultures ornementales, les fraises, les épinards d'eau asiatique (tung choy, kankon, rao muong), et dans le cannabis cultivé en serre ou dans d'autres structures fermées. Ne pas utiliser dans les abri-serres (grands tunnels).
- Pucerons des racines du riz (*Rhopalosiphum rufiabdominale*) dans le cannabis.
- Doryphore de la pomme de terre dans les cultures d'aubergines en serres.
- Pucerons, thrips, aleurodes et punaises dans les mûres et framboises (sous-groupe de cultures 13-07A**) cultivées en serres ou dans d'autres structures fermées. Ne pas utiliser dans les grands tunnels.

*Cultures de légumes de serre sur lesquelles BIOCERES G WP peut être utilisé :

Groupe de cultures 1: Légumes-racines et légumes-tubercules

Groupe de cultures 3-07: Légumes-bulbes

Groupe de cultures 4-13: Légumes-feuilles

Groupe de cultures 5-13: Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre *Brassica*

Groupe de cultures 8-09: Légumes-fruits

Groupe de cultures 9: Cucurbitacées

Groupe de cultures 25: Fines herbes

Groupe de cultures 26: Épices

Groupe de cultures 1 (Légumes-racines et légumes-tubercules) : Arracacha; Bardane comestible; Betterave à sucre; Betterave potagère; Canna comestible; Carotte; Céleri-rave; Cerfeuil tubéreux; Chayotte; Chervis; Chicorée; Crosne du Japon; Curcuma; Curcuma d'Amérique; Daïkon; Dolique tubéreux; Gingembre; Ginseng; Igname; Manioc, amer et doux; Marante; Navet; Panais; Patate douce; Persil à grosse racine; Pomme de terre; Radis; Raifort; Rutabaga; Salsifis; Scolyme; Scorsonère; Souchet comestible; Tanier; Taro; Topinambour

Groupe de cultures 3-07 (Légumes-bulbes) : Ail chinois; Ail des bois; Ail d'Orient, bulbe; Ail penché; Ail rocambole, bulbe; Ail, bulbe; Ciboule, feuilles; Ciboulette chinoise, feuilles fraîches; Ciboulette, feuilles fraîches; Échalote, bulbe; Échalote, feuilles fraîches; Fritillaire; Hémérocalles, bulbe; Hosta « Elegans »; Kurrat; Lis; Oignon « Beltsville bunching »; Oignon de Chine, bulbe; Oignon patate, bulbe; Oignon perle; Oignon vert; Oignon, bulbe; Oignon, frais; Poireau; Rocambole, bulbilles.

Groupe de cultures 4-13 (Légumes-feuilles) : Amarante; Amarante tricolore; Aneth, feuille fraîche; Arroche; Aster des Indes; Baselle; Bette à carde; Bident poilu; Bourse-à-pasteur; Brocoli chinois; Calalou; Caya blanc; Cerfeuil, feuille fraîche; Cham-chwi; Cham-na-mul; Chénopode Bon-Henri; Chénopode de Berlandier; Chénopode géant; Chipilín; Chou à faucher; Chou à grosses côtes; Chou cavalier; Chou frisé; Chou pak-choï; Chrysanthème des jardins; Colza, feuille; Coriandre, feuille fraîche; Cosmos; Cresson alénois; Cresson de fontaine; Cresson de terre; Dang-gwi; Dolnam-mul; Ebolo; Endive; Épinard; Épinard de Nouvelle-Zélande; Feuille de moutarde; Foo yip; Grassé; Herbe-le-rail; Jute, feuille; Laitue amère; Laitue frisée; Laitue pommée; Maca; Mâche; Mizuna; Moutarde d'Abyssinie; Navet, feuille; Oseille; Persil, feuille fraîche; Pissenlit; Plantain lancéolé; Pourpier d'hiver; Pourpier potager; Primevère des jardins; Radicchio; Radis, feuille; Rapini; Roquette; Roquette sauvage; Scarole; Cultivars, variétés et hybrides de ces denrées.

Groupe de cultures 5-13 (Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre *Brassica*) : Brocoli; Chou de Bruxelles; Chou pommé; Chou pé-tsaï; Chou-fleur; Cultivars, variétés et hybrides de ces denrées.

Groupe de cultures 8-09 (Légumes-fruits) : Aubergine; Aubergine d'Afrique; Aubergine écarlate; Baie de Goji; Bicorné; Cerise de terre; Cocona; Fausse aubergine; Morelle réfléchie; Morelle scabre; Narangille; Okra; Pépino; Piment autre que poivron; Poivron; Roselle; Tamarille; Tomate; Tomate du désert; Tomate groseille; Tomatille; Cultivars, variétés et hybrides de ces denrées.

Groupe de cultures 9 (Cucurbitacées) : Chayotte (fruit); Courge cireuse; Pastèque à confire; Concombre; Concombre des Antilles; Gourde comestible (y compris la gourde hyotan et la courge-bouteille, la gourde hechima et l'okra chinois); Momordique (y compris la pomme de merveille, la margose amère et la margose à piquants); Melon véritable (hybrides et/ou cultivars de *Cucumis melo*, y compris le cantaloup, le melon ananas, le melon brodé, le melon de Perse, le melon serpent, ainsi que les melons Casaba, Crenshaw, Golden pershaw, Honey ball, Mango, Honeydew et Santa Claus); Citrouille; Courge d'été (y compris la courge à cou tors, le pâtisson, la courge à cou droit, la courge à moelle et la courgette); Courge d'hiver (y compris la courge musquée et la courge hubbard, la courge poivrée et la courge spaghetti); Pastèque (hybrides et/ou variétés de *Citrullus lanatus*).

**Sous-groupe de cultures 13-07A : Mûres et framboises. Mûre (*Rubus eubatus*, y compris les nombreux cultivars, variétés et/ou hybrides connus en anglais sous des noms tels que Andean blackberry, arctic blackberry, bingleberry, black satin berry, boysenberry, brombeere, California blackberry, Chesterberry, Cherokee blackberry, Cheyenne blackberry, common blackberry, coryberry, darrowberry, dewberry, Dirksen thornless berry, evergreen blackberry, Himalayaberry, hullberry, lavacaberry, loganberry, lowberry, Lucretiaberry, mammoth blackberry, marionberry, mora, mures deronce, nectarberry, Northern dewberry, olallieberry, Oregon evergreen berry, phenomenalberry, rangeberry, ravenberry, rossberry, Shawnee blackberry, Southern dewberry, tayberry, youngberry et zarzamora), mûre de Logan, framboise (noire et rouge), framboise sauvage, et cultivars, variétés et hybrides de ces denrées.

Groupe de cultures 25 (Fines herbes) : Absinthe, feuille fraîche; Absinthe, feuille séchée; Acajou de Chine, feuille fraîche; Acajou de Chine, feuille séchée; Achillée millefeuille, feuille fraîche; Achillée millefeuille, feuille séchée; Agastache fenouil, feuille fraîche; Agastache fenouil, feuille séchée; Agripaume cardiaque, feuille fraîche; Agripaume cardiaque, feuille séchée; Aigremoine, feuille fraîche; Aigremoine, feuille séchée; Amla, feuille fraîche; Amla, feuille séchée; Aneth, feuille séchée; Angélique de Daourie, feuille fraîche; Angélique de Daourie, feuille séchée; Angélique, feuille fraîche; Angélique, feuille séchée; Armoise aurone, feuille fraîche; Armoise aurone, feuille séchée; Armoise japonaise, feuille fraîche; Armoise japonaise, feuille séchée; Armoise pontique, feuille fraîche; Armoise pontique, feuille séchée; Armoise, feuille fraîche; Armoise, feuille séchée; Aspérule odorante, feuille fraîche; Aspérule odorante, feuille séchée; Aubépine monogyne, feuille fraîche; Aubépine monogyne, feuille séchée; Avaram, feuille fraîche; Avaram, feuille séchée; Baguenaudier d'Éthiopie, feuille fraîche; Baguenaudier d'Éthiopie, feuille séchée; Balsamite, feuille fraîche; Balsamite, feuille séchée; Basilic africain, feuille fraîche; Basilic africain, feuille séchée; Basilic américain, feuille fraîche; Basilic américain, feuille séchée; Basilic citron, feuille fraîche; Basilic citron, feuille séchée; Basilic nain, feuille fraîche; Basilic nain, feuille séchée; Basilic sacré, feuille fraîche; Basilic sacré, feuille séchée; Basilic, feuille fraîche;

Basilic, feuille séchée; Ben oléifère, feuille fraîche; Ben oléifère, feuille séchée; Bétoine, feuille fraîche; Bétoine, feuille séchée; Bois enivrant, feuille fraîche; Bois enivrant, feuille séchée; Bourrache, feuille fraîche; Bourrache, feuille séchée; Brède mafane, feuille fraîche; Brède mafane, feuille séchée; Brunelle, feuilles fraîche; Brunelle, feuilles séchée; Buisson de miel, feuille fraîche; Buisson de miel, feuille séchée; Calament à grandes fleurs, feuille fraîche; Calament à grandes fleurs, feuille séchée; Calament glanduleux, feuille fraîche; Calament glanduleux, feuille séchée; Calament, feuille fraîche; Calament, feuille séchée; Camomille romaine, feuille fraîche; Camomille romaine, feuille séchée; Camomille, feuille fraîche; Camomille, feuille séchée; Capucine, feuille fraîche; Capucine, feuille séchée; Carmantine de Ceylan, feuille fraîche; Carmantine de Ceylan, feuille séchée; Céleri, feuille séchée; Centella asiatique, feuille fraîche; Centella asiatique, feuille séchée; Cerfeuil musqué, feuille fraîche; Cerfeuil musqué, feuille séchée; Cerfeuil, feuille séchée; Chataire commune, feuille fraîche; Chataire commune, feuille séchée; Chataire multifide, feuille fraîche; Chataire multifide, feuille séchée; Chimaphile à ombelles, feuille fraîche; Chimaphile à ombelles, feuille séchée; Chirette verte, feuille fraîche; Chirette verte, feuille séchée; Chrysanthème matricaire, feuille fraîche; Chrysanthème matricaire, feuille séchée; Ciboulette chinoise, feuille séchée; Ciboulette, feuille séchée; Citronnelle, feuille séchée; Citronnelle, feuille séchée; Collinsie du Canada, feuille fraîche; Collinsie du Canada, feuille séchée; Coriandre bolivienne, feuille fraîche; Coriandre bolivienne, feuille séchée; Coriandre du Mexique, feuille fraîche; Coriandre du Mexique, feuille séchée; Coriandre vietnamienne, feuille fraîche; Coriandre vietnamienne, feuille séchée; Coriandre, feuille séchée; Cresson de Para, feuille fraîche; Cresson de Para, feuille séchée; Croix-de-Malte, feuille fraîche; Croix-de-Malte, feuille séchée; Cryptoténie du Canada, feuille fraîche; Cryptoténie du Canada, feuille séchée; Cumin des prés, feuille fraîche; Cumin des prés, feuille séchée; Échinacée, feuille fraîche; Échinacée, feuille séchée; Épazote, feuille fraîche; Épazote, feuille séchée; Épigée rampante, feuille fraîche; Épigée rampante, feuille séchée; Épilobe à petites fleurs, feuille fraîche; Épilobe à petites fleurs, feuille séchée; Épipède à grandes fleurs, feuille fraîche; Épipède à grandes fleurs, feuille séchée; Estragon du Mexique, feuille fraîche; Estragon du Mexique, feuille séchée; Estragon, feuille fraîche; Estragon, feuille séchée; Eucommia pseudo-orme, feuille fraîche; Eucommia pseudo-orme, feuille séchée; Eupatoire perfoliée, feuille fraîche; Eupatoire perfoliée, feuille séchée; Euphorbe pilulifère, feuille fraîche; Euphorbe pilulifère, feuille séchée; Euphrasie, feuille fraîche; Euphrasie, feuille séchée; Fenouil de Florence, feuille séchée; Fenouil, feuille fraîche; Fenouil, feuille séchée; Fenugrec, feuille fraîche; Fenugrec, feuille séchée; Férule gommeuse, feuille fraîche; Férule gommeuse, feuille séchée; Fleurs comestibles fraîches, nombreuses espèces; Fleurs comestibles séchées, nombreuses espèces; Fumeterre officinale, feuille fraîche; Fumeterre officinale, feuille séchée; Galéga officinal, feuille fraîche; Galéga officinal, feuille séchée; Galéopsis, feuille fraîche; Galéopsis, feuille séchée; Gattilier de Chine, feuille fraîche; Gattilier de Chine, feuille séchée; Gattilier, feuille fraîche; Gattilier, feuille séchée; Gentiane jaune, feuille fraîche; Gentiane jaune, feuille séchée; Géranium citronné, feuille fraîche; Géranium citronné, feuille séchée; Géranium rosat, feuille fraîche; Géranium rosat, feuille séchée; Géranium, feuille fraîche; Géranium, feuille séchée; Germandrée dorée, feuille fraîche; Germandrée dorée, feuille séchée; Grande capucine, feuille fraîche; Grande capucine, feuille séchée; Grande chélidoine, feuille fraîche; Grande chélidoine, feuille séchée; Grande ortie, feuille fraîche; Grande ortie, feuille séchée; Grande oseille, feuille fraîche; Grande oseille, feuille séchée; Grande pervenche, feuille fraîche; Grande pervenche, feuille séchée; Grande pimprenelle, feuille fraîche; Grande pimprenelle, feuille séchée; Griffes-de-chat, feuille fraîche; Griffes-de-chat, feuille séchée; Grindélie squarreuse, feuille fraîche; Grindélie squarreuse, feuille séchée; Gros-thym, feuille fraîche; Gros-thym, feuille séchée; Guayasa, feuille fraîche; Guayasa, feuille séchée; Guimauve, feuille fraîche; Guimauve, feuille séchée; Gymnéma, feuille fraîche; Gymnéma, feuille séchée; Herbe à paddy, feuille fraîche; Herbe à paddy, feuille séchée; Herbe sainte, feuille fraîche; Herbe sainte, feuille séchée; Hierochloé odorante, feuille fraîche; Hierochloé odorante, feuille séchée; Hydraste du Canada, feuille fraîche; Hydraste du Canada, feuille séchée; Hysope géante, feuille fraîche; Hysope géante, feuille séchée; Hysope officinale, feuille fraîche; Hysope officinale, feuille séchée; Immortelle d'Italie, feuille fraîche; Immortelle d'Italie, feuille séchée; Jasmin, feuille fraîche; Jasmin, feuille séchée; Kaloupilé, feuille fraîche; Kaloupilé, feuille séchée; Laurier, feuille fraîche; Laurier, feuille séchée; Lavande, feuille fraîche; Lavande, feuille séchée; Lierre, feuille fraîche; Lierre, feuille séchée; Livèche, feuille fraîche; Livèche, feuille séchée; Lobélie gonflée, feuille fraîche; Lobélie gonflée, feuille séchée; Lyclope d'Europe, feuille fraîche; Lyclope d'Europe, feuille séchée; Lycopode denté, feuille fraîche; Lycopode denté, feuille séchée; Mamaki, feuille fraîche; Mamaki, feuille séchée; Marjolaine de jardin, feuille fraîche; Marjolaine de jardin, feuille séchée; Marjolaine d'Espagne, feuille fraîche; Marjolaine d'Espagne, feuille séchée; Matricaire camomille, feuille fraîche; Matricaire camomille, feuille séchée; Mauve des bois, feuille fraîche; Mauve des bois, feuille séchée; Mélisse, feuille fraîche; Mélisse, feuille séchée; Menthe à épis, feuille fraîche; Menthe à épis, feuille séchée; Menthe à feuille rondes, feuille fraîche; Menthe à feuille rondes, feuille séchée; Menthe à longue feuille, feuille fraîche; Menthe à longue feuille, feuille séchée; Menthe aquatique, feuille fraîche; Menthe aquatique, feuille séchée; Menthe des champs, feuille fraîche; Menthe des champs, feuille séchée; Menthe gracile, feuille fraîche; Menthe gracile, feuille séchée; Menthe poivrée, feuille fraîche; Menthe poivrée, feuille séchée; Menthe pouliot, feuille fraîche; Menthe pouliot, feuille séchée; Menthe, feuille fraîche; Menthe, feuille séchée; Millepertuis, feuille fraîche; Millepertuis, feuille séchée; Molène faux-bouillon-blanc, feuille fraîche; Molène faux-bouillon-blanc, feuille séchée; Monarde écarlate, feuille fraîche; Monarde écarlate, feuille séchée; Monarde fistuleuse, feuille fraîche; Monarde fistuleuse, feuille séchée; Monarde ponctuée, feuille fraîche; Monarde ponctuée, feuille séchée; Monarde, feuille fraîche; Monarde, feuille séchée; Mûrier blanc, feuille fraîche; Mûrier blanc, feuille séchée; Nigelle de Damas, feuille fraîche; Nigelle de Damas, feuille séchée; Nigelle papilleuse, feuille fraîche; Nigelle papilleuse, feuille séchée; Onagre bisannuelle, feuille fraîche; Onagre

bisannuelle, feuille séchée; Origan de Crête, feuille fraîche; Origan de Crête, feuille séchée; Origan du Costa Rica, feuille fraîche; Origan du Costa Rica, feuille séchée; Origan mexicain, feuille fraîche; Origan mexicain, feuille séchée; Origan, feuille fraîche; Origan, feuille séchée; Oseille ronde, feuille fraîche; Oseille ronde, feuille séchée; Oseille, feuille fraîche; Oseille, feuille séchée; Pain de perdrix, feuille fraîche; Pain de perdrix, feuille séchée; Pandanus, feuille fraîche; Pandanus, feuille séchée; Patchouli, feuille fraîche; Patchouli, feuille séchée; Pensée, feuille fraîche; Pensée, feuille séchée; Perille, feuille fraîche; Perille, feuille séchée; Persil, feuille fraîche; Persil, feuille séchée; Pétalesite, feuille fraîche; Pétalesite, feuille séchée; Petite capucine, feuille fraîche; Petite capucine, feuille séchée; Petite centaurée, feuille fraîche; Petite centaurée, feuille séchée; Petite chélidoine, feuille fraîche; Petite chélidoine, feuille séchée; Petite pimprenelle, feuille fraîche; Petite pimprenelle, feuille séchée; Pimprenelle, feuille fraîche; Pimprenelle, feuille séchée; Plantain majeur, feuille fraîche; Plantain majeur, feuille séchée; Poivre de Chine, feuille fraîche; Poivre de Chine, feuille séchée; Poivre d'eau, feuille fraîche; Poivre d'eau, feuille séchée; Poivrier noir, feuille fraîche; Poivrier noir, feuille séchée; Prêle des champs, feuille fraîche; Prêle des champs, feuille séchée; Prostanthère à feuille incisée, feuille fraîche; Prostanthère à feuille incisée, feuille séchée; Pycnanthème de Virginie, feuille fraîche; Pycnanthème de Virginie, feuille séchée; Pycnanthème gris, feuille fraîche; Pycnanthème gris, feuille séchée; Pycnanthème mutique, feuille fraîche; Pycnanthème mutique, feuille séchée; Pycnanthème verticillé, feuille fraîche; Pycnanthème verticillé, feuille séchée; Pycnanthème, feuille fraîche; Pycnanthème, feuille séchée; Raisin d'ours, feuille fraîche; Raisin d'ours, feuille séchée; Rehmannia, feuille fraîche; Rehmannia, feuille séchée; Reine-des-prés, feuille fraîche; Reine-des-prés, feuille séchée; Romarin, feuille fraîche; Romarin, feuille séchée; Ronce sucrée de Chine, feuille fraîche; Ronce sucrée de Chine, feuille séchée; Rooibos, feuille fraîche; Rooibos, feuille séchée; Rose, feuille fraîche; Rose, feuille séchée; Sapin de Sibérie, feuille fraîche; Sapin de Sibérie, feuille séchée; Sarriette des jardins, feuille fraîche; Sarriette des jardins, feuille séchée; Sarriette des montagnes, feuille fraîche; Sarriette des montagnes, feuille séchée; Sauge banche, feuille fraîche; Sauge banche, feuille séchée; Sauge blanche, feuille fraîche; Sauge d'Espagne, feuille fraîche; Sauge d'Espagne, feuille séchée; Sauge ligneuse, feuille fraîche; Sauge ligneuse, feuille séchée; Sauge sclérée, feuille fraîche; Sauge sclérée, feuille séchée; Sauge, feuille fraîche; Sauge, feuille séchée; Scutellaire latériflore, feuille fraîche; Scutellaire latériflore, feuille séchée; Senné, feuille fraîche; Senné, feuille séchée; Serpolet, feuille fraîche; Serpolet, feuille séchée; Sisymbre officinal, feuille fraîche; Sisymbre officinal, feuille séchée; Souci officinal, feuille fraîche; Souci officinal, feuille séchée; Stévia, feuille fraîche; Stévia, feuille séchée; Tabouret des champs, feuille fraîche; Tabouret des champs, feuille séchée; Tagète à petite fleur, feuille fraîche; Tagète à petite fleur, feuille séchée; Tagète citron, feuille fraîche; Tagète citron, feuille séchée; Tagète des décombres, feuille fraîche; Tagète des décombres, feuille séchée; Tagète érigé, feuille fraîche; Tagète érigé, feuille séchée; Tagète étalé, feuille fraîche; Tagète étalé, feuille séchée; Tagète réglisse, feuille fraîche; Tagète réglisse, feuille séchée; Tanaisie, feuille fraîche; Tanaisie, feuille séchée; Thé des bois, feuille fraîche; Thé des bois, feuille séchée; Thé du mont Olympe, feuille fraîche; Thé du mont Olympe, feuille séchée; Thé-du-Labrador, feuille fraîche; Thé-du-Labrador, feuille séchée; Thuya occidental, feuille fraîche; Thuya occidental, feuille séchée; Thym citron, feuille fraîche; Thym citron, feuille séchée; Thym, feuille fraîche; Thym, feuille séchée; Turnera diffus, feuille fraîche; Turnera diffus, feuille séchée; Uncaire gambir, feuille fraîche; Uncaire gambir, feuille séchée; Verge d'or, feuille fraîche; Verge d'or, feuille séchée; Véronique, feuille fraîche; Véronique, feuille séchée; Verveine citronnelle, feuille fraîche; Verveine citronnelle, feuille séchée; Verveine hastée, feuille fraîche; Verveine hastée, feuille séchée; Violette odorante, feuille fraîche; Violette odorante, feuille séchée; Cultivars, variétés et hybrides de ces cultures.

Groupe de cultures 26 (Épices) : Acacia; Achillée musquée; Acore roseau; Ajowan, graine; Ammi, graine; Aneth, graine; Angélique de Daourie, graine; Angélique, graine; Angostura, écorce; Anis étoilé; Anis, graine; Arbre à neige, écorce; Arbre à soie, écorce; Ase fétide; Ashwagandha, fruit; Aubépine chinoise; Batavia cassia, écorce; Batavia cassia, fruit; Baumier du Pérou; Bétel; Blushwood, graine; Bois amer; Bois enivrant, écorce; Bois-cannelle; Boldo, feuille; Bouleau, écorce; Buchu; Cachoutier, écorce; Cannelier de Chine, écorce; Cannelier de Chine, fruit; Cannelle de Saïgon, écorce; Cannelle de Saïgon, fruit; Cannelle tamala; Cannelle, écorce; Cannelle, fruit; Câpre; Capucine des jardins, gousses; Capucine naine, gousses; Cardamome; Cardamome d'Éthiopie; Cardamome de Malabar; Cardamome du Népal; Cardamome ronde; Cardamome verte; Casse ailé; Cassia, écorce; Cassia, fruit; Céleri, graine; Cerfeuil, graine; Cerisier de Sainte-Lucie; Chardon-Marie; Chou puant, racine; Cirier, écorce; Clavaliér à feuilles de frêne; Clavaliér des Antilles, écorce; Clou de girofle, bourgeon; Colchique d'automne; Combava, feuille; Consoude officinale; Copaiba; Coptide; Coriandre du Mexique, graine; Coriandre, fruit; Coriandre, graine; Coton velu, écorce; Cratéva; Cryptoténie du Canada; Cumin; Cumin des prés, fruit; Cumin noir; Curcuma rond; Échinacée pourpre, graine; Encens; Encens indien; Épipède; Eucalyptus; Eucalyptus à cryptone; Eucommia, écorce; Euphorbe épurge, graine; Euphorbe résinifère; Faux poivrier; Faux santal rouge; Fenouil de Florence, fruit; Fenouil de Florence, graine; Fenouil de porc; Fenouil, fruit; Fenouil, graine; Fenugrec, graine; Fruit miracle; Gaïac; Galbanum, résine; Gambooge; Gattilier de Chine, racine; Gattilier, baie; Génévrier, baie; Gentiane jaune, racine; Germandrée dorée; Gomme adragante; Gomme arabique; Gomme ghatti; Gomme karaya; Graines de Guinée; Grande capucine, gousses; Grande ortie, graine; Griffes de chat, racines; Guarana; Guggul; Gui; Hamamélis de Virginie; Hêtre commun; Jalap; Kaïtha; Kokum; Lentisque; Lis de Malabar, graine; Livèche, graine; Lobélie gonflée, graine; Macis; Magnolia, écorce; Maniguette; Maqui, baie; Micromérie d'Israël; Mioga; Mollé; Moutarde blanche; Moutarde indienne; Moutarde noire, graine; Moutarde, graine; Muira puama; Muscade; Myrobolan bellirique; Myrrhe; Myrrhe bisabol; Myrte anisé; Myrte citronné; Myrte, feuille; Nerprun bourdaine; Nerprun cascara; Nigelle; Nigelle d'Espagne, graine; Nigelle des champs; Okra, graine; Orme rouge; Osha; Pavot, graine; Perille, graine;

Phellodendre de l'Amour; Phyllanthe amer; Piment de la Jamaïque; Pin maritime; Poivre à queue, graine; Poivre blanc; Poivre chinois; Poivre de montagne, baie; Poivre de montagne, feuille; Poivre de Tasmanie, baie; Poivre de Tasmanie, feuille; Poivre dorrigo, baie; Poivre dorrigo, feuille; Poivre du Japon; Poivre du Sichuan; Poivre long de Java; Poivre long indien; Poivre mexicain, feuille; Poivre noir; Poivre sancho; Poivrier noir, grain vert; Prunier d'Afrique; Quassia, écorce; Quebracho, écorce; Quillaja; Quinine; Racine royale; Rauwolfia vomitoria; Rocou, graine; Rue; Safran; Sang de dragon; Sanguinaire du Canada; Santal blanc, graine; Sassafras officinal, écorce; Sassafras officinal, feuilles; Saule; Saule blanc; Sérénia rampant; Sésame, graine; Simaruba, écorce; Stemonia sessilifolia, racine; Suma; Sumac glabre; Sumac odorant; Taheebo, écorce; Tamarin de Malabar; Tamarin, graine; Terminalia sericea; Tilleul d'Amérique, feuille; Torreya de Chine; Tsaoko; Vanille; Véronique de Virginie, racine; Viorne à feuilles de prunier; Viorne obier; Yohimbe; Yucca des Mohave; Cultivars, variétés et hybrides de ces cultures.

MODE D'EMPLOI

Ce produit peut être appliqué avec un équipement de pulvérisation manuel et/ou terrestre conventionnel ou avec un pulvérisateur à faible volume (tel qu'un brumisateurs à froid). Utiliser toujours une solution fraîchement préparée comme indiqué ci-dessous dans les DIRECTIVES POUR LE MÉLANGE. Débuter les traitements dès la première apparition des insectes nuisibles. Les doses d'application, la fréquence des traitements, la couverture de la pulvérisation et la densité des ravageurs influencent la rapidité d'obtention des résultats recherchés. BIOCERES G WP est plus efficace lorsqu'il est appliqué tôt, avant que les populations d'insectes ne deviennent trop importantes. Il faut de 5 à 7 jours après la première application pour observer une baisse des populations d'insectes ravageurs. Appliquer à nouveau au besoin. Plusieurs applications peuvent être nécessaires pour réduire le nombre de ravageurs cibles.

Ne pas mélanger avec un fongicide. Si un fongicide doit être utilisé, assurer l'application du fongicide au moins 4 jours avant l'application de BIOCERES G WP ou au moins 2 jours après l'application de BIOCERES G WP.

Pour évaluer la phytotoxicité potentielle, tester BIOCERES G WP sur un petit nombre de plantes avant d'effectuer une application généralisée.

DOSAGE

Par application foliaire : Appliquer à une concentration de 2 à 4 g (4 g pour le doryphore de la pomme de terre) de BIOCERES G WP/L d'eau en fonction de la densité de la population d'insectes. Utiliser un volume suffisant pour couvrir le feuillage infesté par les insectes nuisibles. La quantité nécessaire dépend de la taille de la culture et de l'équipement de pulvérisation. Selon la culture traitée, un volume de pulvérisation de 500 à 1000 L sont typiquement requis pour 1 ha. Pour les applications foliaires du cannabis, ne pas appliquer après les stades végétatifs.

Par immersion des boutures avant la plantation (non racinées et racinées) : Préparer une suspension d'immersion ayant une concentration de 2 à 4 g de BIOCERES G WP/L. Immerger les boutures dans la suspension pendant 5 secondes. S'assurer que toute la surface des boutures est bien humectée. Ne pas utiliser une suspension plus de 24 heures.

Pour les applications avec un appareil de nébulisation (brumisation) à faible volume : Appliquer à un taux équivalent à la superficie couverte par une pulvérisation foliaire à volume élevé (1 à 4 kg/ha, basé sur des concentrations de 2 à 4 g/L dans des volumes de pulvérisation foliaire de 500 à 1 000 L/ha). Une bonne couverture est essentielle pour de meilleurs résultats. Suivre les instructions du fabricant de l'équipement de pulvérisation pour le volume de pulvérisation final afin d'obtenir une couverture adéquate. Lors de l'utilisation d'un appareil de nébulisation (brumisation) à faible volume, déterminer d'abord le volume d'application approprié en pulvérisant le produit dans une petite zone. Tester l'application sur quelques plantes pour

assurer une bonne couverture. Utiliser la quantité maximale d'eau permise par une machine donnée pour vous assurer que le produit est complètement mélangé. Ne pas diriger la sortie de la buse directement vers les plantes. Ne pas diriger le brouillard de façon qu'il retombe directement sur la culture. NE PAS UTILISER DE BRUMISEUR THERMIQUE (THERMONÉBULISATEUR). Ce type d'équipement produit de la chaleur pendant le processus d'atomisation et ce processus peut endommager les spores de *B. bassiana* ANT-03.

Pour les applications contre les pucerons des racines du riz dans le cannabis : Appliquer ce produit à l'aide d'un équipement d'irrigation manuel étalonné (tel qu'un arroseur manuel avec injecteur) ou d'un pulvérisateur équipé de buses d'arrosage à basse pression comme des buses à jet plat. Appliquer par bassinage de la zone racinaire en utilisant une concentration de 4 à 8 g de BIOCERES G WP/L. S'assurer que le milieu de culture est humide avant l'application pour faciliter le mouvement des spores dans tout le substrat. Appliquer un volume suffisant pour assurer un mouillage complet du milieu de culture, mais sans créer de lessivage. Assurer une distribution uniforme du produit appliqué.

DIRECTIVES POUR LE MÉLANGE

Utiliser une solution fraîchement préparée lors de chaque application.

Suivre les directives suivantes pour préparer le mélange de 2 à 4 g de BIOCERES G WP par litre d'eau (ex. réservoir de 100 L) :

1. Pré-mélanger BIOCERES G WP :
 - a. Mettre 200 à 400 g de BIOCERES G WP dans un contenant étanche et qui peut se fermer
 - b. Ajouter 2 L d'eau propre dans le contenant et fermer
 - c. Secouer vigoureusement pendant 30 secondes
2. Transvider la solution pré-mélangée de BIOCERES G WP dans le réservoir pour l'épandage rempli avec 95 L d'eau
3. Rincer trois fois le contenant du pré-mélange avec 1 litre d'eau et verser à chaque fois le liquide de rinçage dans le réservoir pour l'épandage
4. Agiter constamment pendant l'épandage. Un agent émulsifiant peut-être ajouté.

FRÉQUENCE ET CALENDRIER D'APPLICATION

Par immersion avant la coupe (ensemencement et enracinement) : Appliquer lors de la coupe et de la transplantation.

Pour les autres types d'applications : Appliquer à nouveau dans un délai de 7 jours. En cas d'infestation de ravageurs, le produit peut être utilisé tous les 3 à 5 jours. Plusieurs applications peuvent être nécessaires pour réduire le nombre de ravageurs en cause. Bien qu'il n'y ait aucune limite quant au nombre d'applications pour les cultures agricoles, les applications foliaires du cannabis sont limitées aux stades végétatifs/préfloraison de la culture.

DÉLAI D'ATTENTE AVANT LA RÉCOLTE (DAAR)

Le délai d'attente avant la récolte pour BIOCERES G WP est 0 (zéro) jour et le produit peut être appliqué jusqu'au jour de la récolte.

ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.

2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé par la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage de déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.