



Meilleures utilisations

Le fongicide Compass® 50 WG est un fongicide à large spectre qui offre un contrôle très efficace des maladies foliaires, des tiges et des racines sur les plantes ornementales cultivées en serre et en extérieur.

Principaux atouts : solutions pour les maladies coriaces

Compass 50 WG offre un contrôle résiduel efficace et plus long contre les maladies telles que l'oïdium, le Botrytis, le Rhizoctonia, la tavelure et la rouille.

Calendrier d'application

Appliquer Compass 50 WG en pulvérisation foliaire jusqu'au point d'égouttement avant que la maladie ne soit détectée ou lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie.

Avantages de l'application de Compass® 50 WG

- + Premier fongicide de type strobilurine (QoI) homologué pour une variété d'utilisations sur les plantes ornementales d'extérieur et les plantes ornementales de serre (consultez l'étiquette pour les espèces précises)
- + Offre une excellente protection de contact contre les champignons de surface
- + Protège les nouvelles pousses contre les maladies
- + Hautement translaminaire, ce qui assure une protection de la face inférieure des feuilles
- + Résistance à la pluie en deux heures
- + Les faibles taux d'utilisation en font un excellent produit pour la lutte intégrée contre les parasites
- + Offre une protection des tissus traités et non traités
- + Longue durée, avec 7 à 21 jours de contrôle

Mésostémique pour une protection maximale

- + Forte affinité de liaison de surface sur la plante
- + Absorption par la couche cireuse
- + Redistribution de surface
- + Mouvement de vapeur localisé
- + Activité translaminaire

Profil fongicide du Compass 50 WG

Compass 50 WG contient 50 % de l'ingrédient actif trifloxystrobine et est vendu sous forme de granulés mouillables faciles à utiliser. Utiliser des mélanges en cuve avec des fongicides d'un groupe différent qui sont efficaces sur l'agent pathogène cible lorsque cette utilisation est autorisée. Pour vérifier la compatibilité des autres produits du mélange en cuve, vous devez toujours effectuer un test avant l'utilisation. N'utilisez pas Compass 50 WG en combinaison avec des tensioactifs organosiliciés, car cela pourrait endommager les cultures.



Ingrédients actifs
trifloxystrobine



Groupe
11 fongicide à base de strobilurine



Formulation
50 % WG
(granulés dispersables dans l'eau)



Emballage
Caisse = 4 x 454 g

Le fongicide Compass® 50 WG contrôlera les maladies foliaires suivantes :

Parasite	Culture	Taux de produit (g/100 L)	Intervalle d'application* (jours)	Remarques
Oïdium (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Plantes ornementales de serre et d'extérieur, notamment la monarde, le phlox et le zinnia	15 à 20	14 jours	
Oïdium (<i>Erysiphe azalea</i>)	plantes d'ornement cultivées en serre et à l'extérieur, notamment l' azalée	30	14 jours	
Oïdium (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	Plantes ornementales de serre et d'extérieur de la famille des Rosacées, notamment le rosier	7,5 à 20	14 jours	
Rouille (<i>Puccinia malvacearum</i>)	Arbustes ornementaux d'extérieur de la famille des Malvacées, notamment la rose trémière	15 à 30	7 à 14 jours	Volume de pulvérisation maximal de 1 000 L/ha.
Lutte contre la brûlure du buis (<i>Cylindrocladium pseudonaviculatum</i>)	Plantes ornementales d'extérieur de la famille des buis <i>Buxus</i> spp. (buis) <i>Pachysandra</i> spp. (par exemple, euphorbe du Japon) <i>Sarcococca</i> spp. (buis parfumé)	15	14 jours	Appliquer Compass 50 WG en pulvérisation foliaire jusqu'au point de goutte avant que la maladie ne soit détectée ou lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Volume de pulvérisation maximal de 2 000 L/ha.

Le fongicide Compass 50 WG supprimera les maladies foliaires suivantes :

Parasite	Culture	Taux de produit (g/100L)	Intervalle d'application* (jours)	Remarques
Botrytis et moisissure grise (<i>Botrytis cinerea</i>)	Plantes ornementales de serre et d'extérieur, notamment le géranium, l'hosta et le poinsettia	7,5-30	14 jours	Volume de pulvérisation maximal de 1 000 L/ha.
Oïdium (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	plantes d'ornement cultivées en serre et à l'extérieur, notamment le gerbera	15 à 20	14 jours	Volume de pulvérisation maximal de 1 000 L/ha. Extérieur : intervalle d'entrée restreint de 2 jours pour les « fleurs coupées ».
Tache noire (<i>Diplocarpon rosae</i>)	Plantes d'ornement cultivées en serre et à l'extérieur, notamment le rosier	15 à 20	S/O	Volume de pulvérisation maximal de 1 000 L/ha. Extérieur : intervalle d'entrée restreint de 2 jours pour les « fleurs coupées ».
Suppression de la tache goudronneuse (<i>Rhytisma acerinum</i>)	Érables ornementaux d'extérieur	14-21	S/O	Appliquer Compass 50 WG en pulvérisation foliaire jusqu'au point de goutte avant que la maladie ne soit détectée ou lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. En cas de forte pression, utilisez le taux le plus élevé.

Ne PAS appliquer plus d'une application du fongicide Compass 50 WG avant d'alterner avec une ou plusieurs applications d'un fongicide étiqueté ayant un mode d'action différent. Si aucun autre fongicide n'est homologué, une seule application du fongicide Compass 50 WG peut être effectuée. Le fongicide Compass 50 WG peut être utilisé en toute sécurité sur une large gamme de plantes ornementales, à quelques exceptions près :

- Ne pas appliquer sur les fougères
- L'utilisation sur les pétunias, les violettes et les impatiens de Nouvelle-Guinée peut provoquer des taches sur les fleurs, mais les dommages ne sont pas permanents
- L'utilisation sur le poinsettia après la formation des bractées peut endommager celles-ci
- Il est impossible de tester toutes les variétés ornementales; par conséquent, un test de tolérance est recommandé

Incidence environnementale

Tous les pesticides sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires afin de garantir qu'ils ne présentent pas de risques inacceptables pour la santé humaine ou l'environnement. Pour obtenir des renseignements sur le processus de réglementation des pesticides, consultez le site Web de Santé Canada (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire) <http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/>.

Coordonnées

Pour discuter de vos besoins précis ou pour en savoir plus sur nos solutions, veuillez communiquer avec :

Darcy Olds | Responsable de comptes principale | Serres et pépinières | darcy.olds@envu.com | 905 464-8399

envu™ ca.envu.com 1 800 331-2867



TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE DU PESTICIDE.

Environmental Science U.S. LLC, 5000 CentreGreen Way, Suite 400, Cary, NC 27513. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le produit, composez le numéro sans frais : 1 800 331-2867 ou rendez-vous sur le site www.envu.com.

Les produits ne sont pas tous enregistrés dans tous les États. Compass®, Envu, et le logo Envu sont des marques déposées appartenant à Environmental Science U.S. LLC ou à l'une de ses filiales. © 2025 Environmental Science U.S. LLC.