



Fongicide Fame[®] SC

Meilleures utilisations

Le fongicide Fame[®] SC est idéal pour protéger le gazon sur les terrains de golf, les gazonnières, les terrains de sport et les pelouses contre un large éventail de maladies, notamment la brûlure en plaques, la moisissure rose et grise des neiges, l'antracnose, la plaque estivale, le piétin-échaudage du gazon, la plaque brune et les maladies *pythiennes*.

La puissance de la fluoxastrobine


Fame SC agit en perturbant la respiration des champignons phytopathogènes et constitue un puissant inhibiteur de la germination des spores et de la croissance mycélienne. L'ingrédient actif, la fluoxastrobine, pénètre rapidement dans les racines et les tissus verts par mouvement translaminaire et xylémique. La conception moléculaire de la fluoxastrobine, avec sa structure fluorée unique, offre une systémicité foliaire accrue, ce qui entraîne une distribution foliaire plus uniforme.

Contrôle efficacement

- + Brûlure en plaques
- + Anthracnose (pourriture foliaire et basale)
- + Moisissure des neiges (rose et grise)
- + Piétin-échaudage du gazon
- + Plaque estivale
- + Brûlure foliaire *pythienne*
- + Taches foliaires
- + Plaque brune
- + Plaque causée par *Waitea*

Mobilité rapide

- + Mouvement du xylème et translaminaire dans les feuilles et les racines
- + Résistant au délavage par la pluie en 15 minutes



Stabilité résiduelle

- + Protection longue durée contre les principales maladies du gazon
- + Haute stabilité métabolique augmentant l'activité résiduelle

Santé des plantes

- + Masse racinaire
- + Longueur de la racine
- + Production constante de chlorophylle



Ingrédient actif

Fluoxastrobine – 480 g SA/l



Groupe

Groupe II – QoI



Formulation

Suspension concentrée



Mention d'avertissement

Danger



Emballage

4 contenants de 1,4 l

Utilisation et contrôle

- + Offre une protection interne et externe dans toute la plante pour une protection maximale contre les maladies
- + Appliqué en pulvérisation foliaire pour une absorption et une distribution optimales
- + Pour les maladies d'origine tellurique (piétin-échaudage du gazon et plaque estivale) et les arçures défoliées (pourriture foliaire à l'antracnose et plaque causée par *Waitea*), arroser dans les 15 minutes suivant l'application
- + Convient aux programmes de rotation pour la gestion de la résistance

Durabilité

- + Réduit le besoin d'applications répétées grâce à un contrôle résiduel prolongé

Taux d'application


Consultez l'étiquette du produit pour connaître les taux et le moment d'application spécifiques en fonction de la maladie ciblée et des conditions du gazon.

- + Ne pas appliquer plus de 40 ml/100 m² de fongicide Fame® SC par an, ni plus de 11,5 ml/100 m² par application.


Maladie contrôlée	Débit (ml/100 m ²)	Intervalle d'application (jours)	Volume d'eau (l/100 m ²)
Antracnose – brûlure foliaire	5,8–11,5 ml	14–28	4–8 l
Antracnose – pourriture basale	11,5 ml	14–21	4–8 l
Plaque brune	5,8–11,5 ml	14–28	4–8 l
Brûlure en plaques	5,8–11,5 ml	14–21	4–8 l
Plaque estivale	5,8–11,5 ml	14–28	12–16 l
Piétin-échaudage du gazon	11,5 ml	28	12–16 l
Plaque en anneau brun (plaque causée par <i>Waitea</i>)	5,8–11,5 ml	14–21	4–8 l
Fonte du gazon et taches foliaires	5,8–11,5 ml	14–21	4–8 l
Brûlure foliaire pythienne	11,5 ml	7–14	4–8 l
Moisissure des neiges rose et grise	11,5 ml	S.O.	4–8 l

Taux homologué (/100 m ²)	1 pichet (1,4 l)	1 caisse (4 x 1,4 l)
5,8 ml	6 acres	24 acres
11,5 ml	3 acres	12 acres

Contrôle de la plaque estivale



Contrôle du piétin-échaudage du gazon Préventif



Pour discuter de vos besoins spécifiques ou pour en savoir plus sur nos solutions, veuillez communiquer avec un représentant Envu.

