

2024-0560
2024-11-19

Influence LC

FONGICIDE BIOLOGIQUE CONCENTRÉ LIQUIDE

Pour la répression du blanc
sur les tomates et cultures de cucurbitacées en serre, certaines cultures de légumes-feuilles
cultivées en serre,
et sur le Cannabis (marihuana) produit commercialement à l'intérieur

COMMERCIAL

Principe actif: Poudre d'Ail.....15%

**NUMÉRO D'HOMOLOGATION 30692
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

**SENSIBILISANT POTENTIEL
ATTENTION – IRRITANT POUR LES YEUX
ATTENTION - IRRITANT POUR LA PEAU**

CONTENU NET : 0.2 - 1000 litres

AEF Global inc.
440, 3e avenue, suite 100
Lévis, Qc, Canada G6W 5M6
(418) 838-4441

Ligne d'assistance sans frais : 1-866-622-3222
www.aefglobal.com

MODE D'EMPLOI :

Influence LC est une formulation liquide contenant de l'ail comme matière active.

Influence LC réprime les champignons qui causent le blanc sur les cultures de cucurbitacées en serre, certaines cultures de légumes-feuilles cultivées en serre et les tomates de serre et le Cannabis (marihuana) produit commercialement à l'intérieur. Influence LC devrait être appliqué préventivement ou dès l'apparition des premiers signes d'infection. Des applications répétées et une couverture complète du feuillage sont nécessaires pour maintenir une bonne répression de la maladie.

Ne pas laisser les rejets, les effluents ou le ruissellement des serres contenant ce produit pénétrer dans les lacs, les cours d'eau, les étangs et tout autre plan d'eau.

Le délai d'attente avant la récolte (DAR) est 0 (zéro) jour.

LE MÉLANGE, LA PÉRIODE D'APPLICATION ET L'APPLICATION

Ajouter la quantité requise d'Influence LC dans un volume d'eau propre approprié pour obtenir une bonne couverture.

Ne pas utiliser avec des pulvérisateurs à ultra bas volume.

Directives d'usage spécifiques à la culture

TOMATES DE SERRE		
Maladie	Niveau de protection	Directives
Blanc (<i>Oïdium neolycopersici</i>)	Répression	Utiliser une dose de 1,8% avec un pulvérisateur à haut volume (ex hydraulique). Ne pas excéder 18L/ha. Assurer une couverture complète du feuillage. Répéter les applications à des intervalles de 7-10 jours pour maintenir une réduction de la maladie.

CULTURES DE CUCURBITACÉES EN SERRE (Groupe de cultures 9*)		
Maladies	Niveau de protection	Directives
Blanc (<i>Podosphaera xanthii</i>)	Répression	Utiliser une dose de 1,8% avec un pulvérisateur à haut volume (ex hydraulique). Ne pas excéder 18L/ha. Assurer une couverture complète du feuillage. Utiliser le Influence LC à 0.45% en mélange avec le Cyclone à 0,3% sans surfactant.

		Répéter les applications à des intervalles de 7-10 jours pour maintenir une réduction de la maladie.
*Chayotte (fruits); gourde chinoise (melon chinois en conserve); melon citronné; Concombre; Cornichon; Gourde, comestible (comprend hyotan, cucuzza); Gourde, comestible (comprend hechima, gombo chinois); Momordica spp. (comprend la pomme baumière, la poire baumière, le melon amer, les concombres chinois); Melon musqué (hybrides et/ou cultivars de Cucumis melo; comprend le vrai cantaloup, le cantaloup, le casaba, le melon crenshaw, le melon pershaw doré, le melon miel, les boules de miel, le melon mangue, le melon persan, le melon ananas, le melon Père Noël et le melon serpent); Citrouille; Courge d'été (comprend la courge à col crook, la courge pétoncle, la courge à col droit, la moelle de légumes, la courgette); Courge d'hiver (comprend la courge musquée, la calabaza, la courge hubbard, la courge poivrée, la courge spaghetti); Pastèque (comprend les hybrides et/ou les variétés de Citrillus lanatus)		

Laitue (amère, pommée, feuille dont Romaine), Endive, Chrysanthème guirlande, Cosmos et Chicorée rouge cultivées en serre		
Maladies	Niveau de protection	Directives
Blanc (<i>Golovinomyces (Erysiphe) cichoracearum</i>)	Répression	Utiliser une dose de 1,8% avec un pulvérisateur à haut volume (ex hydraulique). Ne pas excéder 18L/ha. Assurer une couverture complète du feuillage. Répéter les applications à des intervalles de 7-10 jours pour maintenir une réduction de la maladie.

CANNABIS (MARIHUANA) PRODUIT COMMERCIALEMENT À L'INTÉRIEUR		
Maladies	Niveau de protection	Directives
Blanc (<i>Golovinomyces (Erysiphe) cichoracearum</i>)	Répression	Utiliser une dose de 1,8% avec un pulvérisateur à haut volume (ex hydraulique). Ne pas excéder 18L/ha. Assurer une couverture complète du feuillage. Répéter les applications à des intervalles de 7-10 jours pour maintenir une réduction de la maladie.

Mélanges en cuve :

Influence LC peut être mélangé avec (un engrais, un supplément ou avec) des produits antiparasitaires homologués, dont les étiquettes permettent aussi les mélanges en cuve, à la condition que la totalité de chaque étiquette, y compris le mode d'emploi, les mises en garde, les restrictions, les précautions relatives à l'environnement et les zones tampons sans pulvérisation, soit suivie pour chaque produit. Lorsque les renseignements inscrits sur les étiquettes des produits d'association au mélange en cuve divergent, il faut suivre le mode d'emploi le plus restrictif. Ne pas faire de mélanges en cuve avec des produits contenant le même principe actif, à moins que ces produits soient recommandés spécifiquement sur cette étiquette. Dans certains cas, les produits de lutte antiparasitaire mélangés en cuve peuvent entraîner une activité biologique réduite ou des dommages accrus à la culture hôte. L'utilisateur devrait communiquer avec le service technique d'AEF Global au servtechserv@aefglobal.com pour demander des renseignements avant

d'appliquer tout mélange en cuve qui n'est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette. AEF Global recommande d'effectuer un test en pot avec tous mélanges de produits avant le mélange en cuve.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Sensibilisant potentiel pour la peau.

Peut irriter les yeux.

Peut irriter la peau.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter d'inhaler les brouillards de pulvérisation. Peut causer des irritations respiratoires.

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, de gants imperméables, des chaussures et des chaussettes ainsi que des lunettes de protection pour manipuler, mélanger, charger et appliquer le produit et durant toute activité de nettoyage et de réparation.

De plus, les applicateurs utilisant un pulvérisateur à moteur doivent porter un respirateur doté d'un dispositif de retenue de type cartouche à baïonnette (pour les particules) et d'un filtre N-95, R-95, P-95 ou HE.

Les personnes sensibles ou allergiques à l'ail devraient éviter de manipuler le produit.

NE PAS circuler ou permettre à quiconque de circuler dans les sites traités jusqu'à ce que le produit pulvérisé soit sec.

La manipulation et le chargement d'Influence LC ainsi que les activités de nettoyage et d'entretien doivent se faire dans un endroit bien aéré.

Les personnes sans protection devront demeurer à l'extérieur des sites traités pendant toute la durée du traitement.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes.

au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter les symptômes.

ENTREPOSAGE

Conserver le contenant bien fermé à l'écart de la lumière directe du soleil et à des températures entre 4 ° et 20° C. Une température d'entreposage plus froide est préférable. Entreposer ce produit loin de la nourriture pour les humaine ou animale.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale/territoriale.
3. Rendre le contenant vide inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale/territoriale.
5. Pour obtenir des renseignements sur l'élimination du produit inutilisé ou superflu, s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial/territorial de réglementation responsable. En cas de déversement et de nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant et à l'organisme provincial/territorial de réglementation responsable.

AVIS À L'UTILISATEUR Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.