



Efficacité exceptionnelle pour un contrôle durable de la maladie

Meilleures utilisations

Maladies contrôlées :

- Oïdium et botrytis sur les concombres, tomates, poivrons, fraises et plantes ornementales cultivés en serre.
- Mildiou précoce sur tomates de serre.
- Botrytis dans la laitue de serre.

Points forts

- Efficacité exceptionnelle pour un contrôle durable de la maladie.
- Mouvement systémique ascendant dans la plante.
- Protège les nouvelles pousses.
- Ce nouvel ingrédient actif permet de continuer à contrôler les souches fongiques qui ont développé une résistance aux traitements chimiques autres que les SDHI.

Méthodes d'application

- Enregistré comme traitement foliaire pour les concombres, tomates, poivrons, aubergines, laitues, fraises et plantes ornementales cultivés en serre.
- Homologué comme application par trempage uniquement pour les tomates.

Mode d'action

- Le fluopyram inhibe l'enzyme succinate déshydrogénase (complexe II) dans la chaîne respiratoire mitochondriale de la cellule fongique. La classe chimique est celle du pyridinyléthylbenzamide.
- Le fluopyram est classé comme fongicide systémique à mouvement acropète, protégeant les parties non traitées de la plante en se déplaçant vers le haut et vers l'extérieur avec le flux d'eau.

Mesures de précaution importantes pour toutes les utilisations mentionnées sur l'étiquette

- Ne pas appliquer en cas de faible luminosité, car cela pourrait endommager les cultures.
- Alternier le fongicide Luna Privilege® Greenhouse avec d'autres fongicides non-SDHI (groupe 7).
- Attendez au moins six semaines entre deux applications successives de Luna Privilege Greenhouse.
- Lors d'une application foliaire, NE PAS utiliser Luna Privilege Greenhouse en mélange avec d'autres pesticides, engrais ou adjuvants.
- Effectuez un test de sensibilité des cultures sur un petit nombre de plantes avant d'envisager une application à l'ensemble de la culture, car toutes les variétés n'ont pas été testées pour leur phytotoxicité dans toutes les conditions. Lors de tests sur un petit nombre de plantes, attendre au moins une semaine après l'application pour déterminer leur sensibilité. Ne pas appliquer sur la culture si une réaction négative ou indésirable est observée ou si un test de sensibilité n'a pas été effectué.
- Utiliser un volume de pulvérisation minimum de 1 000 L par hectare.
- Ne pas appliquer plus de 500 g de fluopyram par hectare par saison.



Ingrédients actifs

fluopyram 500 g/L



Code FRAC

groupe 7 (SDHI)



Systémicité

acropète



Formulation

suspension
concentrée



Délai de sécurité après traitement

12 heures



IAR (Intervalle avant la récolte)

Peut être appliqué jusqu'au jour de la récolte des tomates, des concombres et des poivrons. La laitue nécessite un délai avant récolte de 7 jours.

Application par pulvérisation foliaire

Plante	Maladies contrôlées	Taux (mL/ha)
Concombres de serre, aubergines, poivrons, tomates	Botrytis	500
Concombres de serre, aubergines, poivrons, tomates	Oïdium	100
Tomates de serre	Mildiou précoce	150-300
Fraises de serre	Botrytis et oïdium	500
Plantes ornementales de serre et d'extérieur	Botrytis	500
Plantes ornementales de serre et d'extérieur	Oïdium	150-500

Application par goutte à goutte/trempage

Plante	Maladies contrôlées	Taux
Tomates de serre	Moisissure grise Botrytis foliaire Chancre de la tige par Botrytis	40 mL pour 1 000 plantes
Laitue de serre	Botrytis	500 mL/ha

Mesures de précaution importantes supplémentaires à suivre lors de l'application sur des tomates de serre :

- Ne pas appliquer avant la floraison sur la neuvième grappe ou avant le 1^{er} mars.
- Appliquer dans le cadre d'un cycle d'irrigation normal, en fin de journée lors du dernier arrosage.
- Éviter l'application lorsque les conditions favorisent une croissance rapide.
- Il est prouvé que les tomates cerises et les variétés à petits fruits non greffées (feuilles plus petites et plus fines) sont plus sensibles.
- Effectuez un traitement test et, après une semaine, vérifiez toute réaction négative de la culture. Si une réaction négative de la culture est constatée, ne pas appliquer. Si un traitement test n'est pas possible, l'application n'est pas recommandée.

Darcy Olds

Responsable des comptes clés, serre et épinière – Canada
 darcy.olds@envu.com • 905-464-8399

envu™ Greenhouse
 & Nursery

ca.envu.com 1-800-331-2867



LISEZ ET SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE.

Environmental Science U.S. LLC, 5000 CentreGreen Way, Suite 400, Cary, NC 27513. Pour plus d'informations sur le produit, appelez gratuitement le 1-800-331-2867. www.envu.com. Tous les produits ne sont pas enregistrés dans tous les États. Envu, le logo Envu et Luna Privilege® sont des marques de commerce appartenant à Environmental Science U.S. LLC ou à l'une de ses filiales. ©2025 Environmental Science U.S. LLC.